



## Ahnungslose HIV-Infektionen

**In den USA und in Europa** sind homosexuelle Männer die am häufigsten von HIV-Infektionen betroffene Bevölkerungsgruppe. Eine besondere Gefährdung geht von Männern aus, die keine Kenntnis von ihrer Erkrankung haben.

**Zwischen 1994 und 2000** wurden in den USA homosexuelle Männer im Alter zwischen 15 und 29 Jahren befragt und auf HIV getestet. Von den 5649 Teilnehmern waren 573 (10%) HIV-positiv.

**77 % der Betroffenen wussten nichts von ihrer Infektion.**

Die 439 Männer mit einer bis dahin unbekanntem Infektion berichteten über insgesamt 2253 männliche Sexualpartner in den zurückliegenden sechs Monaten.

**51 %** hatten ungeschützten Analverkehr gehabt.

**59 %** stuften sich selbst als nicht besonders HIV-gefährdet ein.

Das weitere Ansteigen der HIV-Epidemie unter den homosexuellen Männern in den USA kann zum Teil auf diese jungen HIV-infizierten Männer zurückgehen,

die nichts von ihrer Infektion wissen und ihre Sexualpartner unwissentlich gefährden.

**Präventionsprogramme** müssen vor allem auf diese Männer abzielen. Dabei sollten die Nachfrage nach HIV-Tests gesteigert, die Verfügbarkeit von Tests verbessert und die Zeit bis zum Vorliegen des Testergebnis verkürzt werden.

**Viele homosexuelle Männer kennen ihren HIV-Status nicht und tragen durch ungeschützten Verkehr zu einer weiteren Verbreitung der Infektion bei.**



### Quelle:

MacKellar DA et al.: Unrecognized HIV infection. risk behaviors, and perceptions of risk among young men who have sex with men: opportunities for advancing HIV prevention in the third decade of HIV/AIDS.

J Acquir Immune Defic Syndr 38 (2005) 603-614